




EUROAZIJSKI DABAR

Castor fiber
u Požeško-slavonskoj županiji

Euroazijski dabar (*Castor fiber* L.) je najveći glodavac sjeverne hemisfere. Poluvodena je vrsta što znači da živi u vodi i na kopnu, odličan je plivač te dobro roni. Starije jedinke narastu do 1 m dužine, a visina u hrptu im je od 30 do 40 cm. Vrlo široki i plosnati rep dug je oko 30 - 40 cm. Odrasli dabar može težiti u prosjeku od 20 do 30 kg. Stražnji dio glave je širok, a sužava se prema tupoj njušci. Vrat mu je kratak i debeo. Noge su kratke, a stražnje noge su malo duže od prednjih. Između prstiju ima plivaću kožicu. Prednje noge imaju snažne prste i nokte kojima se služi za kopanje zemlje, pridržavanje i nošenje drveća. Tijelo mu je prekriveno dlakom, osim repa koji je prekriven ljuskama. Boja dlake je tamno kestenjasto-sivkasta, a na trbuhu je svjetlija. Obitelj dabrova se sastoji od roditeljskog para i dvije generacije mladunčadi.

U Hrvatskoj je dabar u potpunosti nestao krajem 19. stoljeća. Nakon unošenja dabrova iz Njemačke od 1996. do 1998. godine, kada je ispušteno na tri odvojena lokaliteta (Žutica, Legrad, Česma) ukupno 85 jedinki u Hrvatskoj se brojno stanje značajno popravilo i danas ima nekoliko tisuća jedinki te se planira reguliranje brojnosti.



Štete od dabara.

Praćenjem stanja utvrđeno je rapidno širenje dabara u lipičkom i pleterničkom području u posljednjih desetak godina. Štete čini pregrađivanjem vodotoka, na poljoprivrednim površinama i u voćnjacima.

